

第二十三届“希望杯”全国数学邀请赛

高一 第1试试题

一、选择题(每小题4分,共40分.)

1. 集合 $M = \{x \mid y = \sqrt{-x^2 + 6x + 7}, x, y \in \mathbf{R}\}$, $N = \{y \mid y = \sqrt{-x^2 + 6x + 7}, x, y \in \mathbf{R}\}$, 则集合 $M \cap N =$ ()

- (A) \emptyset . (B) $[-1, 4]$. (C) $[-1, 7]$. (D) $[0, 4]$.

2. 设 m, n 是自然数, 条件甲: $m^3 + n^3$ 是偶数; 条件乙: $m - n$ 是偶数, 则甲是乙的()

- (A) 充分不必要条件. (B) 必要不充分条件.
(C) 充分且必要条件. (D) 既不充分也不必要条件.

3. 已知直二面角 $\beta - l - \gamma$, 直线 $a \subset$ 平面 β , 直线 $b \subset$ 平面 γ , 且 a 和 b 都不垂直于 l , 那么, a 与 b ()

- (A) 可能垂直, 但不可能平行. (B) 不可能垂直, 但可能平行.
(C) 可能垂直, 也可能平行. (D) 不可能垂直, 也不可能平行.

4. 设 S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的乘积, 若 $a_9 = 1$, 则下面的等式中正确的是()

- (A) $S_1 = S_{19}$. (B) $S_3 = S_{17}$. (C) $S_5 = S_{12}$. (D) $S_8 = S_{11}$.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{a_n - \sqrt{3}}{\sqrt{3}a_n + 1}$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 则 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2012} =$ ()

- (A) $-\sqrt{3}$. (B) 0. (C) $\sqrt{3}$. (D) $1006\sqrt{3}$.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 60^\circ, 2AB = 3BC$, 则 $\tan A$ 的值等于()

- (A) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. (B) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. (D) $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

7. Suppose $\triangle ABC$ is a triangle with the side length of 2, D and E are moving points on the sides BC and AC . $AD \perp BE$ at point M , then the length of M 's trajectory is()

- (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) $\frac{\pi}{3}$. (C) $\frac{\pi}{4}$. (D) $\frac{\pi}{6}$.

(英汉词典: trajectory 轨迹)

8. 若 $f(1, 1) = 1234, f(x, y) = k, f(x, y + 1) = k - 3$, 则 $f(1, 2012) =$ ()

- (A) -6033 . (B) -4799 . (C) 1235 . (D) 2012 .

9. 下面判断正确的是()

- (A) $b^2 - 4ac \geq 0$ 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有解的充分且必要条件.
(B) $b^2 - 4ac < 0$ 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 无解的充分且必要条件.
(C) $c \neq 0$ 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 无解的必要不充分条件.
(D) $b^2 - 4ac > 0$ 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有解的必要不充分条件.

10. 已知函数 $f(x) = m |x - 1|$ ($m \in \mathbf{R}$, 且 $m \neq 0$). 设向量 $\mathbf{a} = (1, \cos\theta)$, $\mathbf{b} = (2, 2\sin\theta)$, $\mathbf{c} = (4\sin\theta, 1)$, $\mathbf{d} = \left(\frac{1}{2}\sin\theta, 1\right)$. 当 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ 时, $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ 与 $f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d})$ 的大小关系是()

- (A) $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) < f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d})$.
 (B) $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) > f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d})$.
 (C) $m > 0$ 时, $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) < f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d})$; $m < 0$ 时, $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) > f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d})$.
 (D) $m > 0$ 时, $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) > f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d})$; $m < 0$ 时, $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) < f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d})$.

二、A 组填空题(每小题 4 分, 共 40 分.)

11. 设 $\alpha \in [0, 2\pi)$, 则在 $[0, 2\pi)$ 内, 终边与 α 角的终边关于 x 轴对称的角是_____.

12. 函数 $f(x) = 3^{-|\log_2 x|} - 4|x - 1|$ 的值域是_____.

13. 若 a, b, c 是三个互不相等的实数, 且满足关系式 $b^2 + c^2 = 2a^2 + 16a + 14$, $bc = a^2 - 4a - 5$, 则 a 的取值范围是_____.

14. 若 a, b 是正实数, 且 $a + b = 2$, 则 $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b}$ 的最小值是_____.

15. $y = a \sin(ax + b) + b$, if the minimum value of y is $\frac{1}{2}$, the maximum value is $\frac{5}{2}$, then $ab =$ _____.

16. 设点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, $GA = 2\sqrt{3}$, $GB = 2\sqrt{2}$, $GC = 2$. 则 $\triangle ABC$ 的面积 =_____.

17. 已知 $0.8 < x < 0.9$, 若将 x, x^x, x^{x^x} 按从小到大的顺序排列, 应当是_____.

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项之和是 S_n , 若 $S_8 \leq 5$, $S_{11} \geq 23$, 则 a_{10} 的最小值是_____.

19. 若 $a \# b = a + b - ab$, 则下列等式中:

- ① $a \# b = b \# a$. ② $a \# 0 = a$. ③ $(a \# b) \# c = a \# (b \# c)$.

正确的是_____.(填序号)

20. $\odot O$ 与 $\odot D$ 相交于 A, B 两点, BC 是 $\odot D$ 的切线, 点 C 在 $\odot O$ 上, 且 $AB = BC$. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 S , 则 $\odot D$ 的半径的最小值是_____.

三、B 组填空题(每小题 8 分, 共 40 分.)

21. 已知 $1 \leq x \leq 8$, 则函数 $f(x) = |x - 3| + |x - 5| + |x - 7|$ 的最大值是_____, 最小值是_____.

22. α, β 是关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-1)x + m^2 - 4 = 0$ 的两个实根, 设 $y = \alpha^2 + \beta^2$, 则 $y = f(m)$ 的解析式是_____, 值域是_____.

23. 已知 $\triangle ABC$ 三条边长分别为 $a = t^2 + 3$, $b = -t^2 - 2t + 3$, $c = 4t$, $t \in \mathbf{R}$, 则 $\triangle ABC$ 的最大内角是角_____, 它的度数等于_____.

24. 方程 $x^2 + \log_{16} x = 0$ 的解是_____; 使不等式 $x^2 - \log_m x < 0$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上恒成立的 m 的取值范围是_____.

25. 若函数 $f(x) = \log_a(x^2 - 2ax + 1 - 2a^2)$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 在 \mathbf{R} 上的最大值是 2, 则 $a =$ _____, $f(x)$ 的单调递增区间是_____.

